FX/102

KARTA ZNIECZULENIA

Klinka Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. dr med. Stanisława Pokrzywnickiego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinką SPZOZ w Bydgoszczy

IMIĘ I NAZWISKO .....
DATA ..... / ..... / ..... r.
ODDZIAŁ ..... WIEK ..... lat(a)
NR HIST. CHOR. ..... WAGA ..... kg WZROST ..... cm

ROZPOZNANIE .....
PLANOWANY ZABIEG .....
OPERATOR ..... ASYSTA .....
UŁOŻENIE PACJENTA .....

SPECJ. ANESTEZJOLOG I .....
SPECJ. ANESTEZJOLOG II .....
LEK. W TRAKCIE SZKOL. .....
PIELĘGNIARKA ANEST. .....

Godzina

GRUPA KRWI ..... **Rh** .....
ASA .....

- ❑ **NIBP** ✕ ❑ **IBP** ✕
- ❑ **Przew. n-m (TOF)**
- ❑ **zabezp. oczy przed uszk. mech.**
- **...** **Tętno**
- ⊗ **Początek i koniec zniecz.**
- ⊙ **Początek i koniec oper.**
- ❑ **Opaska ucisk.** **pocz.** ⊥ **kon.** ⊤
- ❑ **Klem/klips nacz. pocz.** ⇧ **kon.** ⇩

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20

MONITOROWANIE

SpO_2	(%)
$EtCO_2$	(mmHg)
FiO_2	(%)
Tryb wentylacji/VE	(ml)
F	(1/min.)
P peak/PEEP	(cmH_2O)
❑ cewnik w pęch.: diureza	(ml)
utrata krwi	(ml)

LEKI

❑ Sew ❑ Des	(ET%)
❑ Pow ❑ N_2O	l/min.)
Tlen	(l/min.)
Atropina	(mg)
FNT	(mg)
Propofol	(mg)
	(mg)
	(mg)
	(mg)
	(mg)
	(mg)
	(mg)
	( )
	( )
	( )
	( )
Propofol (10 mg/ml) wlew I.v.	(mh/h)
Ultiva (40 ug/ml) wlew i.v.	(mh/h)

PŁYNY

PWE	500 ml
sol. Ringeri	500 ml

UWAGI

Podpis i pieczątka lek. w trakcie szkolenia

Podpis i pieczątka anestezjologa

RODZAJ ZNIECZULENIA

❑ Sedacja ❑ Analgezja ❑ MOA

❑ OGÓLNE:
❑ złożone ❑ dożylne ❑ wziewne
❑ TIVA
indukcja ❑ dożylna ❑ wziewna

❑ REGIONALNE:
❑ PP ❑ ZOP ❑ CSE
❑ splot ramienny ❑ L ❑ P
dostęp ❑ pachowy ❑ nadoboj.
❑ mięśnie pochyle
❑ blok Biera ❑ k.g.(d.).l. ❑ k.g.(d.).p.
❑ nerwy obw. k. górnej ❑ patrz uwagi
❑ nerwy obw. k. dolnej ❑ patrz uwagi
❑ miejscowe inne .....

Technika wykonania

❑ stymulator nerwów ❑ USG
❑ cewnik głębokość .....
rozmiar igły ..... poziom nakłucia .....
ilość prób ..... poziom blokady .....

WENTYLACJA

❑ własna ❑ zastępcza ❑ respirator
❑ ręczna
❑ intubacja ❑ ustno-tch. ❑ nos.-tch.
❑ gładka ❑ trudna
❑ pre-O_2 ❑ M. Sellicka
❑ rurka intubacyjna ❑ zbrojona
❑ rurka dwuświatłowa ❑ L ❑ P
❑ maska krtaniowa ❑ maska twarzowa
❑ bronchofiberoskop ❑ prow. Bougie
❑ kaniula donosowa O_2 ❑ tracheostomia
rozmiar ..... głębokość wprow. .....
skala Malamp. ..... skala C-L .....

DOSTĘP NACZYNIOWY

Żylny obwodowy
Kończyna górna ❑ L ❑ P
Kończyna dolna ❑ L ❑ P
Ż. szyjna zewn. ❑ L ❑ P
Ż. udowa ❑ L ❑ P
Żylny centralny
Ż. podobojczykowa ❑ L ❑ P
Ż. szyjna wewn. ❑ L ❑ P
Tętniczy
T. promieniowa ❑ L ❑ P

Przed znieczuleniem:

Układ oddechowy .....
.....
Układ krążenia .....
.....